対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30042	DDGP療法 （NK/T-cell lymphoma ・高催吐）	21日	高度	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ：炎症性 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ﾛｲﾅｰｾﾞ：非炎症性

留意事項

水分摂取の励行：ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ投与当日点滴前飲水1L、点滴後飲水1L、day5～day6までは1日飲水1L
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3,(4))

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食〔500mL〕「光」 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL）	1本 8mL	点滴 1時間	↓	↓	↓	↓																	
2	生理食塩液（光）（100mL） アロキシ静注0.75mg(5mL) ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 1本 4本	点滴 30分	↓																				
3	生理食塩液（光）（100mL） ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 4本	点滴 30分		↓	↓	↓	↓																
4	生食《50mL》（光）生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 1本	点滴 30分								↓													
5	5%ブドウ糖注射液【100mL】 ゲムシタビン点滴静注用	1本 800mg/㎡	点滴 30分	↓							↓													
6	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 1時間	↓	↓	↓	↓	↓																
7	生食【250mL】（光）生理食塩液 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注	1本 20mg/㎡	点滴 70分	↓	↓	↓	↓																	
8	フロセミド注20mg「トーワ」（2mL）	1本	静注one shot	↓	↓	↓	↓																	
9	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫	1本	点滴 1時間	↓	↓	↓	↓																	
10	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴 5分					↓		↓														
11	5%ブドウ糖注射液≪500mL≫ ロイナーゼ注	1本 6000K/㎡	点滴 1時間	↓		↓		↓		↓														
12	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分	↓		↓		↓		↓	↓													