対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30043	DeVIC療法（高催吐）	21日	高度	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ：炎症性 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 ｲﾎﾏｲﾄﾞ：炎症性
留意事項					
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』（光）生理食塩液 アロキシ静注0．75mg（5mL） ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 1本 39.6mg	点滴 0.5時間	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液 ﾃﾞｷｻｰﾄ6.6mg注/2mL	1本 39.6mg	点滴 0.5時間		↓	↓																		
3	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 5%ブドウ糖注射液(500mL)	100mg/㎡ 1本	点滴　2時間	↓	↓	↓																		
4	カルボプラチン点滴静注 生食〔500mL〕「光」	300mg/㎡ 1本	点滴　2時間	↓																				
5	注射用イホマイド 生食〔500mL〕「光」	1500mg/㎡ 1本	点滴　2時間	↓	↓	↓																		
6	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓	↓	↓																		