対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30044	ESHAP療法（高催吐）	21日	高度	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ：非炎症性 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性

留意事項

持続点滴のｼｽﾌﾟﾗﾁﾝは遮光投与
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3,(4),(5))
ｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与日から投与終了翌日まで、ｽﾃﾛｲﾄﾞ点眼1日4回実施
別途、補液2000ml～3000ml/日

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	アロキシ静注0.75mg(5mL) ソル・メドロール静注用【125mg】 生理食塩液（光）(100mL)	1本 2本 1本	点滴 0.5時間	↓																				
2	ソル・メドロール静注用【125mg】 生理食塩液（光）(100mL)	2本 1本	点滴 0.5時間		↓	↓	↓	↓																
3	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液 5%ブドウ糖注射液《200mL》「ﾌｿｰ」	40mg/㎡ 1本	点滴 1.5時間	↓	↓	↓	↓																	
4	シタラビン点滴静注液 生食(ヒカリ)500ml	2000mg/㎡ 1本	点滴　2時間					↓																
5	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓	↓	↓	↓	↓																
6	生理食塩液（光)【50mL】	1本	点滴　5分	↓																				
7	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 生食(ヒカリ)500ml	25mg/㎡ 1本	持続点滴 24時間	↓	↓	↓	↓																	
8	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分					↓																