対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30045	FCM療法	28日	中等度	ﾌﾙﾀﾞﾗ：非炎症性 ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ：炎症性 ﾉﾊﾞﾝﾄﾛﾝ：壊死性
留意事項					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d22	…	…	d28
1	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注液3mgBag(100mL) デキサート6．6mg注/2mL	1本 9.9mg	点滴 0.5時間	↓																				
2	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注液3mgBag(100mL) デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴 0.5時間		↓	↓																		
3	フルダラ静注 注射用水20mL 生理食塩液（光）(100mL)	25mg/㎡ 1本 1本	点滴 0.5時間	↓	↓	↓																		
4	エンドキサン100mg注射 生食〔500mL〕「光」	200mg/㎡ 1本	点滴 2.5時間	↓	↓	↓																		
5	ノバントロン注 生理食塩液（光）(100mL)	6mg/㎡ 1本	点滴 0.5時間	↓																				
6	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓	↓	↓																		