| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悪性リンパ腫 | R30046 | ICE療法（高催吐） | 21日 | 高度 | ｲﾎﾏｲﾄﾞ：炎症性<br>ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ：炎症性<br>ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：炎症性 |

**留意事項**

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
出血性膀胱炎予防で、ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ400mg/㎡/回を9回投与

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒシナルク3号輸液≪500mL≫<br>重ソーNS84　20mL | 1本<br>1本 | 点滴　6時間 | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ヒシナルク3号輸液≪500mL≫<br>重ソーNS84　20mL | 1本<br>1本 | 点滴　6時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食『100mL』(光)生理食塩液<br>アロキシ静注0．75mg(5mL)<br>デキサート6．6mg注/2mL | 1本<br>1本<br>9.9mg | 側管<br>点滴　30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食《50mL》(光)生理食塩液<br>デキサート6．6mg注/2mL | 1本<br>1本 | 側管<br>点滴　15分 | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食〔500mL〕「光」<br>注射用イホマイド | 1本<br>2g/㎡ | 側管<br>点滴　2時間 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食〔500mL〕「光」<br>エトポシド点滴静注液 | 1本<br>100mg/㎡ | 側管<br>点滴　90分 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒシナルク3号輸液≪500mL≫<br>重ソーNS84　20mL | 1本<br>1本 | 点滴　6時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 生食【250mL】(光)生理食塩液<br>カルボプラチン点滴静注 | 1本<br>5AUC | 側管<br>点滴　60分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 生食《50mL》(光)生理食塩液 | 1本 | 側管<br>点滴　30分 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ヒシナルク3号輸液≪500mL≫<br>重ソーNS84　20mL | 1本<br>1本 | 点滴　6時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |