対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30047	SMILE療法 （NK/T-cell lymphoma ・高催吐）	28日	高度	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ：非炎症性 ｲﾎﾏｲﾄﾞ：炎症性 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ：炎症性

留意事項

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3,(4))
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与開始24時間後、48時間後、72時間後のMTX血中濃度測定
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与終了後、ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝの救援療法を実施
出血性膀胱炎予防で、ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ300mg/㎡/回を9回投与
別途、『R30048 SMILE療法用 ﾛｲﾅｰｾﾞ （NK/T-cell lymphoma）』ﾚｼﾞﾒﾝあり

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d22	…	…	d28
1	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ 重ソーNS84 20mL	1本 1本	点滴 6時間		↓	↓	↓	↓																
2	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ 重ソーNS84 20mL	1本 1本	点滴 6時間	↓	↓	↓	↓																	
3	生食『100mL』(光)生理食塩液 アロキシ静注0．75mg(5mL)	1本 1本	側管 点滴 30分	↓																				
4	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 39.6mg	側管 点滴 30分		↓	↓	↓																	
5	5%ブドウ糖注射液≪500mL≫ メソトレキセート	1本 2000mg/㎡	側管 点滴 6時間	↓																				
6	生食〔500mL〕「光」 注射用イホマイド	1本 1500mg/㎡	側管 点滴 1時間		↓	↓	↓																	
7	5%ブドウ糖注射液≪500mL≫ エトポシド点滴静注液	1本 100mg/㎡	側管 点滴 2時間		↓	↓	↓																	
8	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	側管 点滴 10分	↓	↓	↓	↓																	
9	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ 重ソーNS84 20mL	1本 1本	点滴 6時間	↓	↓	↓	↓																	
10	ヒシナルク3号輸液≪500mL≫ 重ソーNS84 20mL	1本 1本	点滴 6時間	↓	↓	↓	↓																	