対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30049		ト゛キソルヒ゛シン:壊死性 エント゛キサン:炎症性		
留意事項	^ ルケイド: 炎症性				
リッキシマブは、別にレジ 併用経口薬:プレト゛ニソ 経口制吐剤:アプレピタ ト゛キソルヒ゛シン投与時、温					

F	₹р	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20c	յ21
	1	生食《50mL》(光)生理食塩液 プレドニン20mg水溶性(20mg) アロキシ静注0.75mg(5mL)		点滴 15分	Ţ																				
	2	ト゛キソルビ・シン塩酸塩注射液 生食《50mL》(光)生理食塩液	50mg/ ㎡ 1本	点滴 15分	ļ																				
ļ	3	エンドキサン注射 生食〔500mL〕「光」	750mg/ ㎡ 1本	点滴 2時間	\downarrow																				
,	4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	1																				
,	5	へ゛ルケイ・注射 生理食塩液 20mL	1.3mg/ m 0.52mL/ m	皮下注射	Ţ			1				1			1										