対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30053	大量ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ療法	14日	中等度	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ：非炎症性

留意事項
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与開始24時間後、48時間後、72時間後のMTX血中濃度測定 ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与終了後、ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝの救援療法を実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg(5mL)	1本 9.9mg 1本	点滴 0.5時間	↓													
2	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ 5%ブドウ糖注射液(500mL)	3500mg/㎡ 1本	点滴　4時間	↓													
3	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分	↓													