対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
悪性リンパ腫	R30054	大量ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ+ｼﾀﾗﾋﾞﾝ療法（高催吐）	21日	高度	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ：非炎症性 ｼﾀﾗﾋﾞﾝ：非炎症性

留意事項

経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3)
ｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与日から投与終了翌日まで、ｽﾃﾛｲﾄﾞ点眼1日4回実施
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与開始24時間後、48時間後、72時間後のMTX血中濃度測定
ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ投与終了後、ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝの救援療法を実施

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL アロキシ静注0．75mg(5mL)	1本 9.9mg 1本	点滴 0.5時間	↓																				
2	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 1本	点滴　15分		↓	↓																		
3	メソトレキセート 5%ブドウ糖注射液(500mL)	3500mg/㎡ 1本	点滴　4時間	↓																				
4	シタラビン点滴静注液 生食〔500mL〕「光」	2000mg/㎡ 1本	点滴　2時間		↓	↓																		
5	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分	↓	↓	↓																		
6	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴　5分		↓	↓																		
7	シタラビン点滴静注液 生食〔500mL〕「光」	2000mg/㎡ 1本	点滴　2時間		↓	↓																		
8	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴　10分		↓	↓																		