対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
多発性骨髄種	R30201	ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ皮下注 day1, 4, 8, 11	21日	最小度	ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ：炎症性

留意事項

＜Bd療法＞
ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ day1,4,8,11実施
併用経口抗がん剤：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ20mg/日（day1,2,4,5,8,9,11,12）

＜VRd療法＞
ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ day1,4,8,11実施
併用経口抗がん剤：ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg/回/日（day1-14）
ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ20mg/日（day1,2,4,5,8,9,11,12）

＜VMP療法＞１～4ｻｲｸﾙ（ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ42日）
ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞday1,4,8,11,22,25,29,32実施
併用経口抗がん剤：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ(60mg/㎡/日 day1-4)
ﾒﾙﾌｧﾗﾝ（9mg/㎡/日 day1-4）

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	ベルケイド注射 大塚生食注	1.3mg/㎡ 0.52ml/㎡	皮下注射	↓			↓				↓			↓										