

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30204	DRd療法 1サイクル目	28日	軽度	ダラザレックス:非炎症性
留意事項					
前処置薬:ダラザレックス投与60分~180分前カロナル錠800mg、エピナスチン塩酸塩錠10mg内服 併用経口抗がん剤:レブラミトカプセル25mg/回/日(day1-21) 投与時インラインフィルター使用 ダラザレックス投与時、モニター装着					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d22	d28
1	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL	1本 6本	点滴 15分	↓							↓							↓			↓			
2	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 60分	↓							↓							↓			↓			
3	生理食塩液バッグ「フー」(1000mL) ダラザレックス点滴静注	1000mL 16mg/kg	点滴 7時間	↓																				
4	生食[500mL]「光」 ダラザレックス点滴静注	1本 16mg/kg	点滴 4時間								↓							↓			↓			
5	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓							↓							↓			↓			