対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30207	DRd療法 7ｻｲｸﾙ目以降	28日	軽度	ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ：非炎症性

留意事項

前処置薬：ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分～180分前ｶﾛﾅｰﾙ錠800mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
併用経口抗がん剤：ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ25mg/回/日（day1-21）
ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ40mg/日（day8,15,22）
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用
ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d22	…	…	d28
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 6本	点滴　15分	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　60分	↓																				
3	生食〔500mL〕「光」 ダラザレックス点滴静注	1本 16mg/kg	点滴　3時間	↓																				
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴　10分	↓																				