

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30209	DVd療法 2, 3サイクル目(ベルケイト [®] 別)	21日	軽度	ダラザレックス:非炎症性
留意事項					
前処置薬:ダラザレックス投与60分~180分前カロナール錠800mg、エピナスチン塩酸塩錠10mg内服 併用経口抗がん剤:レナテックス20mg/日(day2,4,5,9,11,12) 別途、『R30201ベルケイト [®] 皮下注 day1, 4, 8, 11』レジメンあり、day1,4,8,11実施 投与時インラインフィルター使用 ダラザレックス投与時、モニター装着					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL	1本 3本	点滴 15分	↓							↓							↓						
2	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 60分	↓							↓							↓						
3	生食[500mL]「光」 ダラザレックス点滴静注	1本 16mg/kg	点滴 3時間	↓							↓							↓						
4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓							↓							↓						