対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30210	DVd療法 4ｻｲｸﾙ目以降（ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ別）	21日	軽度	ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ：非炎症性

留意事項

前処置薬：ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分～180分前ｶﾛﾅｰﾙ錠800mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用
ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着

＜DVd療法 4～8ｻｲｸﾙ目＞
併用経口抗がん剤：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ20mg/日（day2,4,5,8,9,11,12）
別途、『R30201 ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ皮下注 day1, 4, 8, 11』ﾚｼﾞﾒﾝあり、day1,4,8,11実施

＜DVd療法 9ｻｲｸﾙ目以降＞
併用経口抗がん剤：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ20mg/日（day2）

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 3本	点滴 15分	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 60分	↓																				
3	生食〔500mL〕「光」 ダラザレックス点滴静注	1本 16mg/kg	点滴 3時間	↓																				
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分	↓																				