| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多発性骨髄腫 | R30211 | DVMP療法 1ｻｲｸﾙ目（ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ別） | 42日 | 軽度 | ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ：非炎症性 |

| 留意事項 |
|---|
| 前処置薬：ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分～180分前ｶﾛﾅｰﾙ錠800mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服<br>投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用<br>ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着<br><br>併用経口抗がん剤：ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ(60mg/㎡/日 day2-4)<br>ﾒﾙﾌｧﾗﾝ（9mg/㎡/日 day1-4）<br>別途、『R30201 ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ皮下注 day1, 4, 8, 11』ﾚｼﾞﾒﾝあり、day1,4,8,11,22,25,29,32実施 |

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | … | … | d8 | … | … | d15 | … | … | d22 | … | … | d29 | … | … | d36 | … | … | d42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食《50mL》（光）生理食塩液<br>デキサート6．6mg注/2mL | 1本<br>3本 | 点滴 15分 | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | |
| 2 | 生食『100mL』（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴 60分 | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | |
| 3 | 生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」（1000mL）<br>ダラザレックス点滴静注 | 1000mL<br>16mg/kg | 点滴 7時間 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液バッグ「ﾌｿｰ」（1000mL）<br>ダラザレックス点滴静注 | 1000mL<br>16mg/kg | 点滴 4時間 | | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | |
| 5 | 生食『100mL』（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴 10分 | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | |