対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30213	DVMP療法 10ｻｲｸﾙ目以降（ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ別）	42日	軽度	ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ：非炎症性

留意事項

前処置薬：ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与60分～180分前ｶﾛﾅｰﾙ錠800mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用
ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	…	…	d8	…	…	d15	…	…	d22	…	…	d29	…	…	d36	…	…	d42
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL	1本 3本	点滴 15分	↓																		
2	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 60分	↓																		
3	生食〔500mL〕「光」 ダラザレックス点滴静注	1本 16mg/kg	点滴 3時間	↓																		
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分	↓																		