

| 対象がん腫   | レジメン番号 | レジメン名                 | インターバル | 催吐性 | 血管への影響       |
|---|--------|-----------------------|--------|-----|--------------|
| 多発性骨髄腫  | R30215 | ダラザレックス初回(DEX 19.8mg) | 7日     | 軽度  | ダラザレックス:非炎症性 |
| 留意事項  |        |                       |        |     |              |
| 前処置薬:ダラザレックス投与60分~180分前カロナール錠800mg、エピナスチン塩酸塩錠10mg内服<br>投与時インラインフィルター使用<br>ダラザレックス投与時、モニター装着 |        |                       |        |     |              |

| Rp | 薬品名                                 | 投与量               | 投与方法   | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
|----|-------------------------------------|-------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 生食《50mL》(光)生理食塩液<br>デキサート6.6mg注/2mL | 1本<br>3本          | 点滴 15分 | ↓  |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 生食『100mL』(光)生理食塩液                   | 1本                | 点滴 60分 | ↓  |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 生理食塩液バッグ「フー」(1000mL)<br>ダラザレックス点滴静注 | 1000mL<br>16mg/kg | 点滴 7時間 | ↓  |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 生食『100mL』(光)生理食塩液                   | 1本                | 点滴 10分 | ↓  |    |    |    |    |    |    |