

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30218	ERd・EPd療法 1サイクル目 day1 (30mL/hr-)	7日	最小度	エムプリシティ:非炎症性
留意事項					
<p>前処置薬:エムプリシティ投与30分～90分前カロナール錠400mg、エピナスチン塩酸塩錠10mg内服 投与時インラインフィルター使用 エムプリシティ投与時、モニター装着</p> <p><ERd療法>併用経口抗がん剤:レブラミドカプセル25mg/回/日(day1-21)</p> <p><EPd療法>併用経口抗がん剤:ホマリストカプセル4mg/回/日(day1-21)</p>					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL ファモチジン注射用《20mg》	1本 6本 1本	点滴 15分	↓						
2	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 45分	↓						
3	生食【250mL】(光)生理食塩液 注射用水20mL エムプリシティ点滴静注	1本 0.4ml/kg 10mg/kg	点滴 2.5時間	↓						
4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 30分	↓						