

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30220	ERd・EPd療法 1サイクル目_day15, 22 1日分(300mL/hr-	7日	最小度	エムプリシティ:非炎症性
留意事項					
前処置薬:エムプリシティ投与30分~90分前カロナール錠400mg、エピナスチン塩酸塩錠10mg内服 投与時インラインフィルター使用 エムプリシティ投与時、モニター装着					
<ERd療法>併用経口抗がん剤:レブラミドカプセル25mg/回/日(day1-21)					
<EPd療法>併用経口抗がん剤:ホマリストカプセル4mg/回/日(day1-21)					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d15 d22	d16 d23	d17 d24	d18 d25	d19 d26	d20 d27	d21 d28
1	生食《50mL》(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL ファモチジン注射用《20mg》	1本 6本 1本	点滴 15分	↓						
2	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 45分	↓						
3	生食【250mL】(光)生理食塩液 注射用水20mL エムプリシティ点滴静注	1本 0.4ml/kg 10mg/kg	点滴 50分	↓						
4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 30分	↓						