対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30223	EPd療法 3ｻｲｸﾙ目	28日	最小度	ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ：非炎症性

留意事項

前処置薬：ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与30分～90分前ｶﾛﾅｰﾙ錠400mg、ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠10mg内服
投与時ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用
ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨ投与時、ﾓﾆﾀｰ装着
＜EPd療法＞併用経口抗がん剤：ﾎﾟﾏﾘｽﾄｶﾌﾟｾﾙ4mg/回/日（day1-21）
ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ40mg/日（day8,15,22）

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d22	…	…	d28
1	生食《50mL》（光）生理食塩液 デキサート6．6mg注/2mL ファモチジン注射用≪20mg≫	1本 6本 1本	点滴 15分	↓																				
2	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 45分	↓																				
3	生食【250mL】（光）生理食塩液 注射用水20mL エムプリシティ点滴静注	1本 0.8ml/kg 20mg/kg	点滴 80分	↓																				
4	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 30分	↓																				