対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30227	KRd療法 13ｻｲｸﾙ目以降	28日	最小度	ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ：炎症性

留意事項

併用経口抗がん剤：ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ20mg/回/日（day1-21）
ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ40mg/日（day1,8,15,22）
投与時、温罨法実施
EKG実施状況確認

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	…	…	d8	d9	d10	…	…	d15	d16	d17	…	…	d22	d23	d24	…	…	d28
1	生食《50mL》（光）生理食塩液	1本	点滴 5分	↓	↓									↓	↓									
2	5%ブドウ糖注射液【50mL】 注射用水20mL カイプロリス点滴静注	1本 13.5ml/㎡ 27mg/㎡	点滴 10分	↓	↓									↓	↓									
3	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分	↓	↓									↓	↓									