対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
多発性骨髄腫	R30229	Kd療法 twice weekly 1ｻｲｸﾙ目	28日	最小度	ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ：炎症性
留意事項					
併用経口抗がん剤：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ20mg/日（day1,2,8,9,15,16,22,23） 投与時、温罨法実施 EKG実施状況確認					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	…	…	d8	d9	d10	…	…	d15	d16	d17	…	…	d22	d23	d24	…	…	d28
1	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分	↓	↓				↓	↓				↓	↓									
2	5%ブドウ糖注射液＜100mL＞ 注射用水20mL カイプロリス点滴静注	1本 10ml/㎡ 20mg/㎡	点滴 30分	↓	↓																			
3	5%ブドウ糖注射液＜100mL＞ 注射用水20mL カイプロリス点滴静注	1本 28ml/㎡ 56mg/㎡	点滴 30分						↓	↓				↓	↓									
4	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓	↓				↓	↓				↓	↓									