| 対象がん腫 | ﾚｼﾞﾒﾝ番号 | ﾚｼﾞﾒﾝ名 | ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ | 催吐性 | 血管への影響 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多発性骨髄腫 | R30232 | Kd療法 weekly 1ｻｲｸﾙ目 | 28日 | 最小度 | ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ：炎症性 |
| 留意事項 | | | | | |
| 併用経口抗がん剤：ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ40mg/日（day1,8,15,22）<br>投与時、温罨法実施<br>EKG実施状況確認 | | | | | |

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | d1 | d2 | d3 | … | … | d8 | d9 | d10 | … | … | d15 | d16 | d17 | … | … | d22 | d23 | d24 | … | … | d28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食《50mL》（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴 5分 | ↓ | | | | | ↓ | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 2 | 5%ブドウ糖注射液＜100mL＞<br>注射用水20mL<br>カイプロリス点滴静注 | 1本<br>10ml/㎡<br>20mg/㎡ | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5%ブドウ糖注射液＜100mL＞<br>注射用水20mL<br>カイプロリス点滴静注 | 1本<br>35ml/㎡<br>70mg/㎡ | 点滴 30分 | | | | | | ↓ | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食『100mL』（光）生理食塩液 | 1本 | 点滴 10分 | ↓ | | | | | ↓ | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |