対象がん腫	ﾚｼﾞﾒﾝ番号	ﾚｼﾞﾒﾝ名	ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ	催吐性	血管への影響
白血病	R30316	FLAG療法（高催吐）	28日	高度	ﾌﾙﾀﾞﾗ：非炎症性 ｼﾀﾗﾋﾞﾝ：非炎症性
留意事項					
経口制吐剤：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ125mg(day1),80mg(day2,3,(4),(5)) ｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与日から投与終了翌日まで、ｽﾃﾛｲﾄﾞ点眼1日4回実施					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	…	…	d22	…	…	d28
1	生理食塩液（光）【50mL】	1本	点滴 5分	↓	↓	↓	↓	↓																
2	フルダラ静注 注射用水20mL 生理食塩液（光）（100mL）	30mg/㎡ 2.5mL 1本	点滴 0.5時間	↓	↓	↓	↓	↓																
3	生理食塩液（光）【50mL】	1本	点滴 5分	↓	↓	↓	↓	↓																
4	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート6．6mg注	1本 9.9mg	点滴 0.5時間	↓																				
5	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート6．6mg注	1本 1本	点滴 0.5時間		↓	↓	↓	↓																
6	シタラビン点滴静注液 5%ブドウ糖注射液《200mL》	2000mg/㎡ 1本	点滴 4時間	↓	↓	↓	↓	↓																
7	生食『100mL』（光）生理食塩液	1本	点滴 10分	↓	↓	↓	↓	↓																