

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
白血病	R30368	ビーリンサイト(45kg以上)1サイクル目 day1-7	7日	最小度	ビーリンサイト:非炎症性
留意事項					
投与時インラインフィルター使用、単独ルートで投与 ルートフラッシュ厳禁 別途レジメンあり 1～5サイクル:ビーリンサイト28日間連続投与、14日間休薬(寛解導入療法2サイクル、地固め療法最大3サイクル) 6～9サイクル:ビーリンサイト28日間連続投与、56日間休薬(維持療法最大4サイクル)					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 デキサート6.6mg注/2mL	1本 3本	点滴 30分	↓						
2	生食【250mL】(光)生理食塩液 大塚生食注(20mL管) 注射用水20mL ビーリンサイト点滴静注	1本 20mL 0.83mL 9μg	持続点滴 24時間	↓						
3	生食【250mL】(光)生理食塩液 大塚生食注(20mL管) 注射用水20mL ビーリンサイト点滴静注	1本 20mL 1.7mL 18μg	持続点滴 48時間		↓		↓		↓	