

対象がん腫	レジメン番号	レジメン名	インターバル	催吐性	血管への影響
白血病	R30381	ベスポンサ 1サイクル目・非寛解時	21日	最小度	ベスポンサ: 非炎症性
留意事項					
遮光投与 前処置薬: ベスポンサ投与30分前加ナール錠400mg、エピナスチン塩酸塩錠10mg内服					

Rp	薬品名	投与量	投与方法	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	d11	d12	d13	d14	d15	d16	d17	d18	d19	d20	d21
1	生食『100mL』(光)生理食塩液 ソルコーテフ注射用100mg(2mL)	1本 1本	点滴 1時間	↓																				
2	生食《50mL》(光)生理食塩液	1本	点滴 5分								↓							↓						
3	生食《50mL》(光)生理食塩液 注射用水20mL ベスポンサ点滴静注	1本 1本 0.8mg/m <sup>2</sup>	点滴 1時間	↓																				
4	生食《50mL》(光)生理食塩液 注射用水20mL ベスポンサ点滴静注	1本 1本 0.5mg/m <sup>2</sup>	点滴 1時間								↓							↓						
5	生食『100mL』(光)生理食塩液	1本	点滴 10分	↓							↓							↓						