

フローズングローブのご案内

通院治療センターではフローズングローブ（手指先用、足指用）を導入致しました。ご希望の方はスタッフまでお声がけ下さい。

☐	ドセタキセルやカバジタキセルの 治療による爪の黒ずみや剥がれ などの副作用を軽減・防止する	
☐	ドキシルの治療による 手掌の紅斑や腫脹などの 副作用の軽減・防止する	
☐	パクリタキセルの治療による しびれの副作用を 軽減・防止する	

✓ 冷えに対して過敏な方、血液循環不良の方、麻痺のある方は
ご使用になれません。

〈使い方〉

- 治療開始15分前から治療終了後15分の間、着用します
寒冷刺激が辛いときは、治療途中にフローズングローブを外す
こともできますので、ご相談ください
- フローズングローブには限りがあります。不足している場合
はアイスノン等で代用することもできます。

〈持参していただく物〉

- 綿手袋
- ビニール袋2枚（260mm×380mm程度の大きさ）
- 洗濯済みの靴下

〈手指先用：パターン①〉



使用例

保冷持続時間2時間

【装着順序】

綿手袋→ビニール袋
→フローズングローブを装着



〈手指先用：パターン②〉



保冷持続時間45分

【装着順序】

綿手袋→ビニール袋
→フローズングローブを装着



〈足指先用〉



A 仕様



B 仕様

（26cmまで）

※ 数に限りがありますので、
仕様を選ぶことはできません。

保冷持続時間2時間

【装着順序】

洗濯済みの靴下
→フローズングローブを装着



平成22年3月作成

平成25年8月一部改訂、平成28年6月一部改訂、平成30年8月一部改訂 令和2年11月一部改訂、
令和3年1月一部改訂、令和4年1月改訂、令和5年10月一部改訂、令和6年2月一部改訂