

フローズングローブのご案内

通院治療センターではフローズングローブ（手指先用、足指用）を導入致しました。ご希望の方はスタッフまでお声がけ下さい。

<input type="checkbox"/>	ドセタキセルやカバジタキセルの治療による爪の黒ずみや剥がれなどの副作用を軽減・防止する	
<input type="checkbox"/>	ドキシルの治療による手掌の紅斑や腫脹などの副作用の軽減・防止する	
<input type="checkbox"/>	パクリタキセルの治療によるしびれの副作用を軽減・防止する	

✓ 冷えに対して過敏な方、血液循環不良の方、麻痺のある方はご使用になれません。

〈使い方〉

- 治療開始15分前から治療終了後15分の間、着用します
寒冷刺激が辛いときは、治療途中にフローズングローブを外すこともできますので、ご相談ください
- フローズングローブには限りがあります。不足している場合はアイスノン等で代用することもできます。

〈持参していただく物〉

- 綿手袋
- ビニール袋2枚（260mm×380mm程度の大きさ）
- 洗濯済みの靴下

〈手指先用：パターン①〉



使用例

保冷持続時間2時間

【装着順序】

綿手袋→ビニール袋
→フローズングローブを装着



〈手指先用：パターン②〉



保冷持続時間45分

【装着順序】

綿手袋→ビニール袋
→フローズングローブを装着



〈足指先用〉



保冷持続時間2時間

【装着順序】

洗濯済みの靴下
→フローズングローブを装着



平成22年3月作成

平成25年8月一部改訂、平成28年6月一部改訂、平成30年8月一部改訂 令和2年11月一部改訂、
令和3年1月一部改訂、令和4年1月改訂、令和5年10月一部改訂